



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 010 50 08



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

CIPROFLOXACINA HCL

Ciprofloxacina é um fluorquinolônico sintético, bactericida que não apresenta resistência cruzada com as penicilinas, cefalosporinas, tetraciclina e aminoglicosídeos. Atua por inibição do DNA-girase bacteriana. Interferindo na replicação do DNA. Na forma oral, combina uma biodisponibilidade elevada com grande penetração tissular que permite seu emprego como monoterapia ou em combinação com outros antibióticos.

INDICAÇÕES:

Ciprofloxacina atua sobre os germes gram-positivos: *Staphylococcus aureus*, *pyogenes* e *pneumoniae*, *Streptococcus faecalis*, *Mycobacterium tuberculosis*. Microorganismos gram-negativos: *Escherichia coli*, *Klebsiellas*, *Enterobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Aeromonas*, *Vibrium* *Brucella melitensis*. Ciprofloxacina tem indicação nos seguintes quadros clínicos: infecção no trato geniturinário, da pele e tecidos moles, infecções das vias respiratórias, gastrintestinais e infecções sistêmicas graves.

DOSE:

Adulto: Gonorréia não complicada: 250 a 500mg, via oral, dose única. Demais infecções: 250 a 750mg, via oral, cada 12 horas, durante 7 a 10 dias.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais freqüentes: distúrbios gastrintestinais e toxicidade do SNC (tonturas, cefaléia, insônia).

PRECAUÇÕES:

- Ciprofloxacina pode ser administrado via oral em jejum ou junto com alimentos.
- Reduzir a posologia, de acordo com o valor da depuração da creatinina, em pacientes com comprometimento renal.
- Evitar a administração de antiácidos: defasar por 2 horas as ingestões orais de antiácidos e do antibiótico fluorquinolônico.
- Os fluorquinolônicos têm baixa atividade contra anaeróbios e não são efetivas no tratamento da sífilis.

INTERAÇÕES:

O uso concomitante de antiácidos reduz a absorção do fluorquinolônico. O Ciprofloxacino pode causar aumento de até 50% das concentrações séricas de teofilina.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Ciprofloxacina é contra-indicada a pacientes com hipersensibilidade à droga e outros fluorquinolônicos. Gravidez, lactação e crianças.