



# Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



[grupopurifarma](https://www.instagram.com/grupopurifarma)



Purifarma

## DESONIDE MICRONIZADO

### IDENTIFICAÇÃO

**Fórmula Molecular:** C<sub>24</sub>H<sub>32</sub>O<sub>6</sub>

**PM:** 416,51

**DCB:** 02797(Desonida)

**CAS:** 638-94-8

### PROPRIEDADES:

Usada geralmente como creme, loção e unguento, por via tópica. É anti-inflamatório tópico, antiprurítico, vasoconstrutor e adrenocorticoide tópico

### INDICAÇÃO

A Desonida creme é indicada como anti-inflamatório e antipruriginoso tópico nas dermatoses sensíveis aos corticosteroides, destinando-se ao tratamento de lesões agudas exsudativas e/ou situadas em áreas úmidas.

### DOSE E USO

O produto destina-se exclusivamente para uso externo.

Desonida creme Aplicar uma fina camada do produto sobre a área afetada, até que se verifique a melhora; após o que, diminuir o número de aplicações.

Adultos: uma a três vezes ao dia.

Crianças: uma vez ao dia.

**Nota:** se a lesão for superficial e de pouca extensão, a aplicação através de fricção é suficiente para debelar o quadro. No caso da dermatose exigir o uso de curativo oclusivo, recomenda-se cobrir a área afetada com plástico ou celofane após a aplicação do medicamento, deixando em contato pelo tempo estabelecido pelo médico. Não deixar entrar em contato com os olhos, nem utilizar o produto na região próxima aos mesmos. A interrupção do tratamento deve ser gradativa, à medida que os sintomas forem desaparecendo, seguindo orientação médica.

### REAÇÕES ADVERSAS

As reações indesejáveis dos corticosteroides tópicos estão diretamente relacionadas com a potência do corticosteroide, concentração, o volume aplicado, o modo de aplicação (se oclusivo ou não) e o tempo do tratamento. Os efeitos adversos mais frequentemente encontrados são as atrofia cutânea, estrias, telangiectasias, hipopigmentação, hipertricose e púrpura senil. Podem também agravar ou mascarar quadros infecto-parasitários. Retardam a cicatrização de úlceras e ferimentos da pele. Ocasionalmente, podem provocar dermatites de contato, porém geralmente isto se deve aos componentes da forma farmacêutica. Os efeitos sistêmicos, tais como Síndrome de Cushing, hiperglicemia e glicosúria, podem ocorrer devido à absorção em grandes quantidades de corticosteroide e/ou uso prolongado, e geralmente quando usados em curativos oclusivos. As crianças e os hepatopatas são mais susceptíveis. O risco de supressão do eixo hipotalâmico-hipofisário- adrenal (HHA) aumenta com a potência do preparado, assim como com a superfície de aplicação e com a duração do tratamento. A função adrenal volta a normalidade com a suspensão do tratamento.

**Interferência com o Diagnóstico** - a função adrenal avaliada mediante a estimulação de corticotrofina (ACTH) ou por medida de cortisol no plasma e a função do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal podem diminuir se ocorrer uma absorção significativa de corticosteroide, especialmente em crianças. As



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

concentrações de glicose no sangue e na urina podem aumentar devido a atividade hiperglicêmica intrínseca dos corticosteroides.

## PRECAUÇÃO

**Interrupção do Tratamento** - se houver desenvolvimento de irritação local, o uso de Desonida deve ser gradualmente descontinuado e a terapia apropriada deverá ser instituída. Na presença de infecção, um agente adequado antimicótico ou antibacteriano deverá ser usado. Se não houver resposta favorável, a Desonida deverá ser descontinuada até que a infecção tenha sido controlada apropriadamente.

**Gravidez** - apesar de não haver evidência de efeitos colaterais sobre a gravidez, a segurança do uso de corticosteroides tópicos nesse período ainda não foi estabelecida de modo definitivo.

**Amamentação** - não se sabe se os corticosteroides tópicos são excretados no leite ou que tenham causado problemas em lactentes quando usados corretamente. Entretanto, não se deve aplicar o medicamento nos seios pouco antes de amamentar.

**Pediatria** - devido à maior relação superfície da pele/peso corpóreo, crianças podem demonstrar maior susceptibilidade à supressão do eixo HHA e Síndrome de Cushing induzidas por corticosteroides tópicos do que os pacientes adultos. Foram relatados casos de supressão adrenal e retardamento do crescimento em crianças, produzidos pela absorção sistêmica de corticosteroides tópicos. Deve-se ter especial cuidado, sobretudo quando são tratadas áreas extensas ou utilizados curativos oclusivos.

**Geriatria** - pessoas idosas não apresentaram efeitos adversos diferentes dos problemas relatados em adultos jovens.

**Problemas Médicos** - a relação risco benefício deve ser avaliada no caso de tratamento prolongado em pacientes com Diabetes mellitus ou com Tuberculose.

## CONTRA-INDICAÇÕES

O produto é contraindicado a pessoas com antecedentes de hipersensibilidade a Desonida, em lesões tuberculosas, sífilíticas e virais (como herpes, varicela ou varicela). Não deve ser utilizado nos olhos ou nas áreas próximas a eles.

## REFERÊNCIA

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014