



# Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



grupopurifarma



Purifarma

## HESPERIDINA

### IDENTIFICAÇÃO:

**Fórmula Molecular:** C<sub>28</sub>H<sub>34</sub>O<sub>15</sub>

**PM:** 610,57

**DCB:** 04619

**CAS:** 520-26-3

### PROPRIEDADES:

É um flavonoides encontrado em limões e limas (*citrus sinensis*). Tem sido usada no tratamento da fragilidade capilar. No Brasil é usada em associação medicamentosa indicada como venotônico e vasculoprotetor, em varizes, hemorroidas e hemorragias.

### INDICAÇÃO

Tratamento das manifestações da insuficiência venosa crônica, funcional e orgânica, dos membros inferiores. - Tratamento dos sintomas funcionais relacionados à insuficiência venosa do plexo hemorroidário. - Alívio dos sinais e sintomas pré e pós-operatórios de safenectomia. - Alívio dos sinais e sintomas pós-operatórios de hemorroidectomia. - Alívio da dor pélvica crônica associada à Síndrome da Congestão Pélvica.

### DOSE E USO

Usada via oral, pela combinação de:

500mg: diosmina 450mg + hesperidina 50mg fração flavonóica purificada micronizada  
1000mg: diosmina 900mg + hesperidina 100mg fração flavonóica purificada micronizada

Na doença venosa crônica, a posologia usual é:

500mg: 2 comprimidos ao dia, sendo um pela manhã e outro à noite.

1000mg: 1 comprimido ao dia, preferencialmente pela manhã; Os comprimidos devem ser administrados preferencialmente durante as refeições, por pelo menos 6 meses ou de acordo com a prescrição médica.

Na crise hemorroidária aguda, a posologia usual é:

500mg: 6 comprimidos ao dia durante os quatro primeiros dias e, em seguida, 4 comprimidos ao dia durante três dias. E após, 2 comprimidos ao dia por pelo menos 3 meses ou de acordo com a prescrição médica.

1000mg: 3 comprimidos ao dia durante os quatro primeiros dias e, em seguida, 2 comprimidos ao dia durante três dias. E após, 1 comprimido ao dia por pelo menos 3 meses ou de acordo com a prescrição médica.

No período pré operatório de safenectomia, a posologia usual é:

500mg: 2 comprimidos ao dia;

1000mg: 1 comprimido ao dia; Os comprimidos devem ser administrados durante 4 a 6 semanas ou de acordo com a prescrição médica.

No período pós operatório de safenectomia, a posologia usual é:

500mg: 2 comprimidos ao dia;

1000mg: 1 comprimido ao dia; Os comprimidos devem ser administrados por pelo menos 4 semanas ou de acordo com a prescrição médica.

No período pós-operatório de hemorroidectomia, a posologia usual é:



# Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



[grupopurifarma](https://www.instagram.com/grupopurifarma)



[Purifarma](https://www.facebook.com/Purifarma)

500mg: 6 comprimidos ao dia durante 3 dias e, em seguida, 4 comprimidos ao dia durante 4 dias.

1000mg: 3 comprimidos ao dia durante 3 dias e, em seguida, 2 comprimidos ao dia durante 4 dias; Os comprimidos devem ser administrados por pelo menos 1 semana ou de acordo com a prescrição médica.

Na dor pélvica crônica, a posologia usual é:

500mg: 2 comprimidos ao dia,

1000mg: 1 comprimido ao dia, Os comprimidos devem ser administrados por pelo menos 4 a 6 meses ou de acordo com a prescrição médica.

Os comprimidos podem se dissolvidos em água antes de administrá-los, se assim os pacientes desejarem. Nesse caso, os comprimidos devem ser dissolvidos em um copo de água com quantidade suficiente para completa dissolução até que uma suspensão homogênea seja obtida.

O comprimido pode ser partido, aberto ou mastigado.

## REAÇÕES ADVERSAS

Os seguintes eventos adversos foram reportados e estão classificados usando a seguinte frequência: muito comuns (>1/10), comuns (>1/100 e 1/1.000 e 1/10.000 e < 1/1.000), reação muito rara (< 1/10.000) e reações com frequência desconhecida (não pode ser estimada pelos dados disponíveis).

Reações comuns (>1/100 e < 1/10): - Diarreia, dispepsia, náuseas e vômitos.

Reações incomuns (>1/1.000 e 1/10.000): - Colite.

Reações raras (>1/10.000 e < 1/1000): - Tontura, dor de cabeça, mal estar, erupção, prurido e urticária.

Reações com frequência desconhecida: - Dor abdominal, edema de face isolada, lábios e pálpebras. Excepcionalmente, edema de Quincke.

## PRECAUÇÃO

Gravidez: Nenhum efeito teratogênico foi demonstrado em vários estudos e nenhum evento adverso foi reportado em humanos. Um estudo aberto realizado com 50 mulheres com gestação entre 8 semanas antes do parto e até após 4 semanas do parto sofrendo de crise hemorroidária registrou alívio dos sintomas agudos a partir do 4º dia de tratamento em 53,6%. O tratamento foi bem aceito e não afetou a gravidez, o desenvolvimento fetal, o peso do neonato, seu crescimento e amamentação materna.

Não se destina ao uso em crianças e adolescentes (com idade inferior a 18 anos).

## CONTRA-INDICAÇÕES

- Não deve ser utilizada nos casos de hipersensibilidade previamente conhecida a substância ativa ou a qualquer um dos componentes da fórmula.
- É contraindicado para o uso em crianças.
- Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Nenhum estudo de interação medicamentosa foi realizado. Entretanto, levando-se em consideração a extensa experiência pós comercialização do produto, nenhuma interação medicamentosa foi reportada até o momento.

## REFERÊNCIA

DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014