



# Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

## MELOXICAM

Meloxicam é uma droga anti-inflamatória não esteróide, inibidor específico da ciclooxigenase-2 (cox-2). Este bloqueio seletivo e específico confere um duplo benefício terapêutico ao conseguir, por um lado, uma notável atividade anti-inflamatória-analgésica nos pacientes reumáticos e, por outro lado, uma excelente tolerância com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Possui uma boa absorção digestiva e uma ótima biodisponibilidade, após uma única dose oral. Difunde-se facilmente até o sangue e tecidos inflamados, possui uma elevada ligação às proteínas plasmáticas e seus metabólitos são excretados em igual proporção tanto na urina como nas fezes.

### INDICAÇÕES:

Meloxicam é indicado em patologias inflamatórias dolorosas ou degenerativas do aparelho osteomioarticular, artrite reumatóide, osteoartrite, osteoartrose, tendinite, bursite, distensões miotendinosas. Processos inflamatórios dolorosos agudos e crônicos.

### DOSE:

Dose de ataque em patologias agudas: 15mg, dose única diária.. Em afecções crônicas ou dose dose de manutenção: 7,5mg, dose única diária. A dose diária máxima não deve ser superior a 15mg/dia.

### EFEITOS ADVERSOS:

Ocasionalmente pode ocorrer dispepsia, náuseas, vômitos, epigastralgias, constipação, flatulência e/ou diarreia. Em nível cutâneo, prurido, exantema, urticária e reações de hipersensibilidade.

### PRECAUÇÕES:

- Pacientes com antecedentes de doenças gastrintestinais ou que recebem anticoagulantes orais.
- Em pacientes com insuficiência renal ou submetidos a hemodiálise, a dose não deve superar 7,5mg/dia.

### INTERAÇÕES:

Anticoagulantes orais: aumentam o risco de sangramento. Lítio: pode aumentar as suas concentrações séricas. Colestiramina: ao ligar-se ao Meloxicam, pode eliminá-lo mais rapidamente. Anti-hipertensivos: podem diminuir seus efeitos por inibição das prostaglandinas vasodilatadoras.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

Meloxicam é contra-indicada em pacientes com úlcera gastroduodenal ativa, insuficiência hepática ou renal severa, gravidez e lactação. Antecedentes de hipersensibilidade ao fármaco ou de asma, angioedema, urticária, pólipos nasais, relacionados com agentes antiinflamatórios não esteróides.