



NEXTIDA GC

Modulação glicêmica e bem-estar metabólico

CAS: 68410-45-7

DCB: não aplicável


Composição: Peptídeos de colágeno.

Uso: oral

Nextida GC é uma formulação exclusiva de peptídeos de colágeno desenvolvida para agir de forma natural nos picos de glicose após as refeições, ao mesmo tempo em que estimula a secreção do hormônio GLP-1.

O aumento do GLP-1 proporciona uma sensação de saciedade ao avisar o estômago para esvaziar mais lentamente, ao mesmo tempo em que reduz a fome ao ativar as áreas do cérebro responsáveis pelo controle do apetite..

Estudos científicos indicam que grandes oscilações nos níveis de glicose após as refeições estão associadas ao aumento do apetite e à ingestão excessiva de alimentos, desencadeando um ciclo vicioso de picos glicêmicos seguidos por quedas abruptas, conforme demonstrado abaixo:



Manter os níveis de glicose sob controle está diretamente ligado a um sono de melhor qualidade, menos fadiga e mais disposição para um estilo de vida ativo. Por outro lado, o desequilíbrio glicêmico pode levar à fadiga constante, alterações de humor e distúrbios do sono.

Com sua ação na estimulação do GLP-1, no equilíbrio glicêmico e na melhoria da resposta à insulina, a composição exclusiva de peptídeos de colágeno do Nextida GC oferece benefícios integrados que vão desde o aumento da saciedade e o controle do peso até o bem-estar emocional e a redução do estresse.

AÇÕES

- Aumento da secreção de GLP-1 e GIP;
- Reduz o pico de glicose no sangue;
- Melhora resposta à insulina.

INDICAÇÕES

- Pré-diabético (metabolismo de glicose desequilibrado);
- Gerenciando a glicose para energia diária;
- Consumidores com sobrepeso.



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](https://www.instagram.com/grupopurifarma)



[Purifarma](https://www.facebook.com/Purifarma)



purifarma.com.br/Blog



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)



purifarma.com.br/Blog

DOSAGEM SUGERIDA

- **Oral:** 5 a 10g dia, 30 minutos do almoço e/ou jantar.
- **Tópico:** Não aplicável.
- **Fator de correção:** não aplicável.

VANTAGENS

- 42% de redução média nos picos de glicose pós-refeição;
- Resultados mensuráveis logo após a ingestão alimentar;
- Segurança e tolerância clinicamente comprovadas;
- Ingrediente de origem do colágeno;
- Ingrediente natural, com origem reciclada e sustentável;
- Estabilidade de temperatura, pH e prazo de validade;
- Aumentou a secreção de GLP-1 e reduziu os picos de glicose sem aumentar a insulina pós-refeição.

FORMAS FARMACÊUTICAS SUGERIDAS

- Snack salgado;
- Cápsula de café;
- Cookies;
- Shot de frutas;
- Gel proteico;
- Sachês.

SUGESTÃO DE FÓRMULA

COMPOSIÇÃO	QUANTIDADES
Nextida GC	5g
Base Efervescente laranja	2g
Posologia: Tomar 1 dose, 30 minutos antes do almoço e jantar.	

REFERÊNCIAS

1. Material do fabricante.

Rev. 0 – 07/07/2025.

