



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

PROMETAZINA

INDICAÇÃO

Cloridrato de prometazina é indicado para o tratamento de reações alérgicas e anafiláticas, na prevenção de vômitos do pós-operatório e enjoos de viagens, entre outras indicações.

Uso adulto - Uso oral

FARMACOCINÉTICA

O cloridrato de prometazina é um medicamento que apresenta propriedades antialérgicas, sedativas e antieméticas.

Os efeitos clínicos do cloridrato de prometazina comprimido revestido são notados dentro de 20 minutos após a administração e geralmente duram de 4 a 6 horas, embora possam persistir até por 12 horas.

POSOLOGIA

Adultos: 2 a 6 comprimidos por dia.

Estas doses devem ser divididas em duas, três ou quatro vezes, reservando-se a maior fração para a noite.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

EFEITOS COLATERAIS

Embora sejam infrequentes, alguns efeitos colaterais podem ocorrer durante o tratamento com cloridrato de prometazina comprimido revestido.

Sonolência é o efeito colateral mais comum.

Outros efeitos, embora raros, podem ocorrer, como tontura, confusão mental, secura da boca, palpitações, queda de pressão, erupções na pele (como urticária, eczema, e manchas avermelhadas no corpo), náuseas e vômitos.

Podem ocorrer alteração na contagem de leucócitos e hemácias e sintomas neurológicos.

CONTRAINDICAÇÕES

O cloridrato de prometazina comprimido revestido não deve ser utilizado por pacientes com conhecida hipersensibilidade à prometazina ou outros derivados fenotiazínicos ou a qualquer componente da fórmula, assim como aos portadores ou com antecedentes de doenças sanguíneas causadas por outros fenotiazínicos, em pacientes com risco de retenção urinária ligado a distúrbios uretro prostáticos, e em pacientes com glaucoma.

A prometazina não deve ser utilizada em crianças menores de dois anos devido ao risco de depressão respiratória fatal.

Este medicamento é contraindicado na faixa etária de 0 a 2 anos.