



**Purifarma**



São Paulo (11) 2067.5600  
Brasil 0800 10 50 08



[www.purifarma.com.br](http://www.purifarma.com.br)



grupopurifarma



Purifarma

## **BENZBROMARONA**

Benzbromarona corresponde a um derivado do etilbenzofurano ligado ao grupo 4-hidroxi-3,5-dibromofenilcetona. Reduz as concentrações plasmáticas do ácido úrico provavelmente bloqueando a reabsorção tubular; também pode aumentar a eliminação intestinal de ácido úrico. Administrada por via oral, é bem absorvida do trato gastrointestinal; a absorção parece ser afetada pelo tamanho das partículas. Excretada principalmente pelas fezes e parcialmente pela urina.

### **INDICAÇÕES:**

Benzbromarona é indicado no tratamento de hiperuricemia.

### **DOSE:**

Via oral, 50 a 200mg ao dia.

### **REAÇÕES ADVERSAS:**

Distúrbios gastrintestinais, especialmente diarreia; pode precipitar ataque agudo de gota e sintomas renais de depósitos de urato.

### **PRECAUÇÕES:**

- Com a finalidade de reduzir o risco de ataque agudo de gota, pode-se administrar Benzbromarona antes da colchicina.
- Não se deve iniciar o tratamento durante ataque agudo de gota.
- Recomenda-se ingestão de líquido e ajuste do pH urinário para reduzir o risco de cálculos renais.
- Deve ser usada com cautela nos pacientes com insuficiência renal.
- É considerada insegura em pacientes com porfiria aguda porque se mostrou porfirinogênica em sistemas in vitro.

### **INTERAÇÕES:**

Doses mais elevadas de Benzbromarona que as normalmente usadas na terapêutica podem aumentar a atividade anticoagulante dos anticoagulantes cumarínicos orais. Aspirina e outros salicilatos antagonizam seus efeitos.

### **CONTRA INDICAÇÕES:**

Benzbromarona é contra-indicado em paciente hipersensíveis à droga.