



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

CARISOPRODOL

Estruturalmente é um dicarbamato de derivado do propanodiol.

Carisoprodol é absorvido no trato gastro-intestinal. É metabolizado no fígado e excretado na urina como metabólito, incluindo meprobamato. É excretado no leite materno em quantidades significativas. A administração por via oral, os efeitos começam dentro de 30 minutos e dura 4 a 6 horas.

INDICAÇÕES:

É um miorrelaxante esquelético central; alívio de sinais e sintomas de espasmo muscular localizado.

DOSE:

Via oral, adultos, 350mg 4x/dia; em idosos a dose pode ser reduzida; em crianças, a dose não foi determinada.

REAÇÕES ADVERSAS:

Os sintomas que incluem fraqueza severa e distúrbios central normalmente diminuem depois de várias horas. Ocorre: sonolência, tontura, obnubilação; ocasionalmente, náusea, vômito, queimação epigástrica, distúrbio abdominal, constipação, diarreia, ou ataxia. Embora muito raramente, pode causar dependência psíquica.

Em caso de overdose pode ocorrer: estupor, coma, choque, depressão respiratória e raramente morte.

INTERAÇÕES:

Álcool, anestésicos gerais, antidepressores tricíclicos, outros depressores do sistema nervoso central, sulfato de magnésio parenteral, hipnoanalgésicos, inibidores da amino-oxidase podem acarretar aumento dos efeitos depressores do sistema nervoso central. Estimulantes do sistema nervoso central antagonizam seus efeitos.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Insuficiência hepática ou renal; porfiria aguda intermitente e depressão do sistema nervoso central.