

# **METFORMINA HCL**



São Paulo (11) 2067.5600 Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

### **Propriedades**

É um hipoglicemiante oral do grupo das biguanidas, que provoca aumento do número de receptores de insulina. Indicado para Diabetes não dependente de insulina (tipo II), especialmente em obesos e em hipersensíveis às sulfoniluréias.

## **Aplicações**

Insuficiência renal, condições hipóxicas, etilismo, gravidez, pré-operatório e pós-operatório e hipersensibilidade a ela.

### Recomendação de uso

Dose usual: 500 a 2.500 mg/dia. Dose Máxima: 2.500 mg/dia.

#### **Efeitos Adversos**

Náuseas, pirose, vômitos, diarréia e sabor metálico. Existe risco de acidose lática, mais frequente em idosos e pacientes com insuficiência renal, sendo menor do que com a fenformina.

#### **Farmacocinética**


É absorvida lentamente e de forma incompleta pelo trato gastrointestinal. Sua biodisponibilidade absoluta de uma dose de 500mg é de aproximadamente de 50-60%, reduzindo se administrada junto com alimentos. Seu tempo de meia-vida de eliminação é de 2-6h. CONTRA

### Interações

Pode reduzir a absorção de Vitamina B12.

## Referências Bibliográficas

- 1. Batistuzo, J.A. de Oliveira et al. Formulário Médico Farmacêutico-2ª edição. São Paulo: Tecnopress, 2002;
- 2. DEF 2004/05 33ª edição. Rio de Janeiro: Ed. de Publicações Científicas, 2004;
- 3. Martindale 1ª edição. Barcelona: Pharma Editores, 2003;
- 4. P.R. Vade-Mécum. 7ªed. São Paulo: Soniak, 2001.







São Paulo (11) 2067.5600 Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

