



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

SULFADIAZINA DE PRATA

A Sulfadiazina de prata é um agente bactericida para a maioria dos microorganismos Gram-positivos e negativos; o mecanismo de ação é diferente do nitrato de prata e da sulfadiazina sódica; age somente na parede celular e na membrana citoplasmática. A absorção é variável, dependendo da área de aplicação tópica e da gravidade das queimaduras; concentrações séricas máximas podem atingir níveis terapêuticos (8 a 12mcg/100ml) nos casos de tratamento de grandes áreas queimadas.

INDICAÇÕES:

A Sulfadiazina de prata é indicada nas infecções associadas a queimaduras (*Candida albicans*, *Citrobacter sp*, *Enterobacter sp*, *Enterococos*, *Escherichia coli*, *Klebsiella sp*, *Mima-Herellea sp.*, *Morganella morganii* (*Proteus morganii*), *P. mirabilis*, *P. vulgaris*, *Providencia rettgeri* (*Proteus rettgeri*), *Pseudomonas aeruginosa*, *P. maltophilia*, *Serratia sp*, *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*, *Streptococos beta-hemolíticos*). Infecções epidérmicas menores (mesmos agentes), e úlcera dérmica.

DOSE:

Espalhar creme 1% (fina camada) sobre a pele afetada, 1 a 2 vezes/dia.

REAÇÕES ADVERSAS:

Reações mais freqüentes: sensação de ardor na área tratada. Reações ocasionais: coloração cinza-castanho da pele, exantema, prurido; aumento da sensibilidade epidérmica à luz.

PRECAUÇÕES:

- Antes da aplicação, o paciente deve tomar banho, auxiliado ou não, para limpeza e retirada de debris. Após a aplicação de sulfadiazina de prata, manter o curativo coberto.

- Não utilizar na gravidez e não amamentar, devido ao risco de causar icterícia no recém-nascido e anemia hemolítica em lactantes glicose-6-fosfato desidrogenase deficientes.

- Não usar em crianças com menos de 1 mês de idade; risco de icterícia.

INTERAÇÕES:

O uso concomitante de Sulfadiazina de prata com colagenase, papaína ou sitalains (enzimas proteolíticas dermatológicas) pode causar inativação enzimática devido à presença de prata.

CONTRA-INDICAÇÕES:

A Sulfadiazina de prata é contra-indicada em pacientes com menos 1 mês de idade e aos pacientes hipersensíveis ao fármaco.