



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



[Purifarma](#)

TIBOLONA

Tibolona é um esteróide anabólico sintético, estruturalmente relacionado com o noretinodrel que exerce efeitos hormonais na mulher pós-menopausada. Estes efeitos consistem de: supressão dos sintomas vasomotores, restabelecimento dos níveis normais de endorfinas, supressão da hipersecreção de gonadotropinas, prevenção da perda óssea. Quando à sua farmacocinética, a tibolona absorve rapidamente após administração oral e sua excreção, 30% via urinária e 60% via fecal. A meia vida de eliminação é de aproximadamente 45 horas, não foi encontrada circulação enteroepática da droga ou de seus metabólitos. A Tibolona é amplamente metabolizada no fígado e nos intestinos.

INDICAÇÃO:

Tibolona é indicado no tratamento dos sintomas da menopausa.

DOSE:

Via oral, 2,5mg/dia, durante, pelo menos, 3 meses.

REAÇÕES ADVERSAS:

Alteração do peso corpóreo, vertigem; dermatose seborréica, cefaléia; sangramento vaginal; alterações nos parâmetros da função hepática; aumento dos pelos faciais; desconforto gastrointestinal, edema pré-tibial.

PRECAUÇÕES:

Não deve ser usada a Tibolona como anticoncepcional oral; não deve ser utilizada durante a pré-menopausa, em mulheres com ciclos regulares; durante o tratamento devem ser realizados exames médicos periódicos; doses maiores que a indicada podem causar sangramentos vaginais; suspender o tratamento quando surgirem sinais de processos tromboembólicos; deve-se levar em consideração a relação risco/benefício quando existem os seguintes problemas médicos: disfunção renal, distúrbios no metabolismo dos carboidratos, enxaqueca, epilepsia ou hipercolesterolemia.

INTERAÇÕES:

Tibolona pode exacerbar a sensibilidade aos anticoagulantes. Fármacos indutores de enzimas podem acelerar a sua biotransformação.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Tibolona é contra indicado em estágios de gravidez; distúrbios hepáticos graves; caso confirmado ou suspeita de tumores estrogênio-dependentes; distúrbios cardíaco ou cerebrovasculares; sangramento vaginal não diagnosticado.